

 HELSE BERGEN - ALT HANDLER OM MENNEKER
Haukeland Universitetssykehus



Anafylaksibehandling

Adrenalinpenn

Agnete Hvidsten
Avdelingssykepleier
Seksjon for klinisk spesialallergologi
Yrkesmedisinsk avdeling



 HELSE BERGEN - ALT HANDLER OM MENNEKER
Haukeland Universitetssykehus

JEXT, ALK



EpiPen, MEDA



Fremgangsmåte

- Hold adrenalinpennen 10 cm fra utsiden av låret
- Støt pennen mot låret, til du hører et kikk, injektoren er da aktivert.
- Hold på plass i 10 sekunder, slik at hele dosen blir injisert.
- Fjern injektoren, og masser det injiserte området i ti sekunder.
- Kan injiseres gjennom klær, men obs på tykke sørmer, glidelås som kan hindre at nålen når inn der den skal.



Ring 113, eller HUS 73333, si ANAFYLAKSI

Adrenalinpenn kan brukes kun en gang

Om nødvendig kan en sette en ekstra dose
etter 5-15 min

Overlever injektoren til ambulansepersonalet eller
akuttmottak



Dosering

Epipen og Jext inneholder 0,3mg-0,3ml

- Barn 0,1ml / 10kg
- Voksne: 0,3mg, evt. x 2

Oppbevaring

- Skal oppbevares i romtemperatur
- Skal ikke utsettes for direkte sollys, ekstrem varme eller kulde

Holdbarhet

- Adrenalinpennen har begrenset holdbarhet, så utløpsdatoen må fortløpende sjekkes






Pris

Samme pris fra begge leverandører
425,- per dose

Dyrt legemiddel,
men en rimelig forsikring.



Når uhellet er ute





Sånn kan det gå

