


# NØKKELTALL 2025



## Akutt intermitterende porfyri Porphyria variegata Hereditær koproporfyri

- 73 % fikk utført bildeundersøkelse av lever som anbefalt hver 6. måned
- 77 % har diagnosen registrert som kritisk informasjon i kjernejournal
- 78 % brukte kun trygge legemidler
- 20 % hadde hatt akutt porfyrianfall
- 3 % innlagt med akutt porfyrianfall



## Kvalitetsforbedring og utviklingstiltak

- Løsning for reservasjon via Helsenorge
- Kvalitetsforbedringsprosjekt: Økt etterlevelse bildeundersøkelse lever
- Kvalitetsforbedringsprosjekt: kritisk informasjon i kjernejournal

## Erytropoietisk protoporfyri

- 54 % tålte mindre enn 30 minutter sollys
- 82 % var vaksinert for hepatitt A+B
- 64 % brukte vitamin-D tilskudd
- 38 % brukte kalsiumtilskudd

## Porphyria cutanea tarda

- 75 % av nydiagnostiserte fikk startet behandling innen 2 måneder
- 64 % var i biokjemisk remisjon
- 5 % rapporterte tilbakefall med blemmer og sår/skjør hud
- 15 % av dem som fikk behandling, ble behandlet pga. nye symptomer

## Deltagelse og datakvalitet

- 5 diagnoser
- 96 % dekningsgrad
- 72 % svarprosent årlig pasientskjema
- 94-100 % skjemakompletthet
- 98 % innregistreringskorrekthet
- 81 % av kvalitetsindikatorene har variabelkompletthet >90 %

