

MR-UNDERSØKELSER VED MULTIPPEL SKLEROSE

NÅR SKAL MR TAS?

VED UTREDNING PÅ DIAGNOSETIDSPUNKTET

Ved utredning av MS tas MR av både hjerne og ryggmarg, ofte med kontrast.

VED BEHANDLINGSSTART

Etter oppstart eller endring av sykdomsmodulerende behandling tas ny MR etter 3–6 måneder.

UNDER OPPFØLGING

Årlige MR-undersøkelser av hjernen uten kontrast.

- MR av ryggmargen tas kun ved symptomer eller funn som ikke forklares av sykdomsaktivitet i hjernen, eller hvis sykdommen primært sitter i ryggmargen.
- MR-intervallet kan forlenges hvis sykdommen er stabil over flere år.

RETT BRUK AV MR

Det kan bli mange MR-undersøkelser over årene en lever med MS.

RETT BRUK av MR gir god evaluering av sykdomsaktivitet og behandlingseffekt.

RETT BRUK av MR reduserer unødvendig bruk av kontrastmiddel over hele ens levetid.

RETT BRUK av MR går ikke på bekostning av trygghet eller kvalitet i oppfølgingen.

TRYGT FOR DEG

INTERNASJONALE ANBEFALINGER fra 2021 standardiserer hvordan MR skal tas og følges opp. Undersøkelsen tar vanligvis mellom 15 og 45 minutter.

MR AV HJERNEN er den viktigste undersøkelsen for vurdering av sykdomsaktivitet og effekt av behandling.

MS-FORANDRING I RYGGMARGEN gir nesten alltid tydelige symptomer. Derfor er det ikke nødvendig med rutinemessige MR-undersøkelser av ryggmarg.

MR MED KONTRAST er bare nødvendig ved utredning, og ved spørsmål om MS-attakk.

UNDERSØKELSENE UTFØRES like godt på private røntgeninstitutt som på sykehus.

Spørsmål om MR ved MS?
Ta kontakt med din behandler.


TO FILMER FRA MS-FORBUNDET



Før undersøkelsen



Gjennomføring av
undersøkelsen



Se denne informasjonen
på nett

