

SOFA skår tabell

SOFA skår, verdiene plukkes ut retrospektivt for de siste 24 timer og er den mest avvikende verdien i dette tidsrommet. Skåringen utføres på fast tidspunkt, eks kl. 08.00 hvert døgn.

Ved manglende verdi, settes siste foregående målte verdi inn.

Skår	Sirkulasjon*	Respirasjon#	Nyrefunksjon	CNS	Koagulasjon	Lever
	MAP og vasopressor	PaO ₂ /FiO ₂ ratio (kPa)	Kreatinin/DU µmol/l & ml	GCS	TPK x 10 ³ /µl	Bilirubin µmol/l
0	MAP ≥ 70	>53	<110	15	> 150	<20
1	MAP < 70	40-53	110-170	13-14	< 150	20-32
2	DA ≤ 5; Dobutamin	26,7 – 39,9	171-299	10-12	< 100	33-101
3	DA > 5; NA/A ≤ 0,1	13,3 – 26,6	300-440 < 500 ml/24t	6-9	< 50	102-204
4	NA/A > 0,1	< 13,3	>440 < 200 ml/24t	<6	< 20	>204

Der det ikke foreligger noen data settes som default SOFA = 0 (normal verdi)

*alle doser gitt i µg/kg/min, DA= Dopamin, NA=Noradrenalin, A=Adrenalin

3 eller 4 poeng bare for pasienter på respirator (NIV+IPPV)

Vincent, J. L., Moreno, R., Takala, J., Willatts, S., de Mendonça, A., Bruining, H., et al. (1996). The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. (Vol. 22, pp. 707–710)