

# **Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon**

## **Årsrapport pr. 31.12.2010**

I registerfilen totalt var n = 2084.


Ved utgangen av 2010 var det n = 1304 registrerte med pågående behandling med langtids mekanisk ventilasjon i Norge (voksne  $\geq 18$  år n = 1215 og barn  $< 18$  år n = 89).

**Prevalens av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) for voksne og barn pr. 31.12.2010**  
**var 26,5 / 100 000,**  
**for barn var prevalens av LTMV 8,1 / 100 000**


- **Kjønnsfordelingen var 43 % kvinner og 57 % menn.**
- **93,3 % av brukerne hadde maske / munnstykke (NIV) som tilslutning**
- **6,7 % hadde trakeotomi som tilslutning**

Deskriptiv statistikk av registeropplysninger er gjort ut fra n = 1304; registrerte brukere med pågående behandling med langtids mekanisk ventilasjon pr. 31.12.2010.

Inndeling av Y-aksen for avlesning av prevalens varierer mellom søylediagrammene.




Bruk av langtids mekanisk ventilasjon (n = 1304) fordelt på alder i dekader.




**Bruk av langtids mekanisk ventilasjon (n = 1304) fordelt på helseregioner.**

Helseregion 1: Sør-Øst  
Helseregion 2: Vest  
Helseregion 3: Midt  
Helseregion 4: Nord




Bruk av langtids mekanisk ventilasjon (n = 1304)  
fordelt på fylker.




Bruk av langtids mekanisk ventilasjon (n = 1304) fordelt på helseregioner og stratifisert for alle registrerte grunnsykdommer.

Helseregion 1: Sør-Øst  
 Helseregion 2: Vest  
 Helseregion 3: Midt  
 Helseregion 4: Nord




Bruk av langtids mekanisk ventilasjon fordelt på helseregioner og stratifisert for de fem hyppigst registrerte nevromuskulære sykdommer.

Helseregion 1: Sør-Øst  
 Helseregion 2: Vest  
 Helseregion 3: Midt  
 Helseregion 4: Nord



Bruk av langtids mekanisk ventilasjon ved adipøs hypoventilasjon fordelt på helseregioner.

Helseregion 1: Sør-Øst  
Helseregion 2: Vest  
Helseregion 3: Midt  
Helseregion 4: Nord



Bruk av langtids mekanisk ventilasjon ved KOLS fordelt på helseregioner.


Helseregion 1: Sør-Øst

Helseregion 2: Vest

Helseregion 3: Midt


Helseregion 4: Nord






Bruk av langtids mekanisk ventilasjon og trakeotomi fordelt på helseregioner.

Helseregion 1: Sør-Øst  
Helseregion 2: Vest  
Helseregion 3: Midt  
Helseregion 4: Nord



Bruk av langtids mekanisk ventilasjon og trakeotomi fordelt på fylker.

Helseregion 1: Sør-Øst  
Helseregion 2: Vest  
Helseregion 3: Midt  
Helseregion 4: Nord



Bruk av langtids mekanisk ventilasjon hos barn fordelt på helseregioner.

Helseregion 1: Sør-Øst  
Helseregion 2: Vest  
Helseregion 3: Midt  
Helseregion 4: Nord